

Est-ce contagieux ?

Non, chez l'enfant ce n'est pas contagieux et aucune recommandation n'est préconisée.

Quand consulter aux urgences ?

Il faut consulter aux urgences :

- Si l'enfant se plaint de douleurs importantes, qu'il ne marche pas normalement
- Si l'enfant a de la fièvre
- Si l'enfant n'arrive plus à uriner, si la rougeur s'étend vers le ventre
- Si vous ne pouvez pas recalotter votre enfant

Dr Claire Tournier, pédiatre. Septembre 2014

Urgences pédiatriques médico-chirurgicales Service du Pr Carbajal
Hôpital Armand Trousseau
26 avenue du Dr Arnold Netter 75012 Paris

Fiche d'information pour les parents

La balanite



**Pour poser le diagnostic de balanite,
il est nécessaire de consulter votre médecin**

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le 112

Urgences pédiatriques médico-chirurgicales
Hôpital Armand Trousseau
26 avenue du Dr Arnold Netter 75012 Paris

**www.urgencetrousseau.fr
pour plus d'informations**

Qu'est-ce que c'est ?

C'est une inflammation de l'extrémité du pénis.

Le plus souvent, l'inflammation est liée à la stagnation des urines et/ou des selles dans la couche, à une irritation mécanique lors des manipulations du pénis par l'enfant (très fréquent entre 2 et 5 ans).

Il ne faut pas décalotter votre enfant.

Que faire à la maison ?

Vous pouvez commencer le traitement à la maison sans nécessairement voir un médecin.

Vous devez impérativement voir un médecin si tout le pénis est rouge et gonflé, ou si la rougeur s'étend et s'il n'y a pas d'amélioration après 48 heures de soins locaux.

Quels sont les symptômes ?

Le petit garçon se plaint d'avoir mal au bout du pénis. Ses urines peuvent le piquer. Une forte douleur n'est pas habituelle et doit faire envisager une complication ou une autre cause. L'extrémité du pénis est rouge et gonflée. Il peut y avoir un écoulement blanchâtre.

Est-ce grave ? Quelle est l'évolution ?

La survenue d'une balanite chez un enfant de moins de 5 ans est très fréquente et très banale.

L'évolution est le plus souvent simple en quelques jours.

Quel est le traitement ?

Il s'agit d'un traitement local antiseptique, à réaliser 4 fois par jour jusqu'à l'amélioration complète (souvent 10 jours) ou des bains de siège pendant 10 min (avec du savon doux ou un antiseptique).

Existe-t-il des moyens de prévention ?

Pour l'éviter, il faut appliquer les mesures d'hygiène habituelles :

- Changez les couches régulièrement.
- Faites une toilette quotidienne avec un savon non irritant.
- Ne décalottez pas votre enfant. Le phimosis (prépuce très serré) est très fréquent chez l'enfant de moins de 6 ans.

Pour faire le diagnostic , il est nécessaire de consulter un médecin.