

Conseils aux parents pour l'ordonnance de Morphine

Oramorph solution buvable (monodoses 10 mg / 5 ml)

Votre enfant a des douleurs qui nécessitent un traitement par morphine. La première dose donnée aux urgences a été bien tolérée. Pour que votre enfant continue d'être soulagé vous allez poursuivre la morphine à la maison. **Il est important de respecter l'ordonnance, la dose et le nombre de prises prescrites par le médecin.**

Nous vous recommandons de bien lire ce qui suit et de suivre les conseils

Préparation

1. Vérifier que la boîte soit **de 10 mg**



1

2. Verser la dosette entière dans un verre



dosette



2

3. Avec la seringue prélever les millilitres (ml) prescrits sur l'ordonnance
Donner la morphine dans la bouche de votre enfant



3

4. Jeter immédiatement le reste dans la poubelle

5. Comme tous les médicaments, la morphine doit être tenue en lieu sûr et hors de portée des enfants

Rapporter à votre pharmacien les dosettes non utilisées

Surveillance pendant toute la durée du traitement

Votre enfant doit avoir un comportement habituel et moins mal

! ATTENTION !

**si votre enfant est plus endormi
si sa respiration est plus lente
s'il fait des pauses respiratoires**

Appelez le 15

Votre enfant est trop fatigué, plus endormi que d'habitude. Il est difficile à réveiller
appelez le 15

Votre enfant doit respirer comme d'habitude. Si sa respiration vous semble plus lente
compter le nombre d'inspiration (soulèvement du thorax) par minute

Si la respiration est très lente moins de

- 20 par minute chez le nourrisson de moins de 1 an
- 15 par minute chez l'enfant de 1 à 5 ans
- 12 par minute chez le grand de plus de 5 ans

appelez le 15

En cas de doute, arrêter la morphine et contacter notre service d'urgences de l'hôpital Trousseau 24/24 au 01 44 73 68 75