

# Conseils aux parents pour l'ordonnance de Morphine Actiskenan® comprimé orodispersible



Votre enfant a des douleurs qui nécessitent un traitement par morphine. La première dose donnée aux urgences a été bien tolérée. Pour que votre enfant continue d'être soulagé vous allez poursuivre la morphine à la maison. **Il est important de respecter l'ordonnance, la dose et le nombre de prises prescrites par le médecin.**

Nous vous recommandons de bien lire ce qui suit et de suivre les conseils

## 1. ATTENTION !

Vérifier que la ou les boîtes correspondent bien aux dosages prescrits




2. Détacher une unité de la plaquette pour pouvoir soulever le coin du blister et sortir le comprimé

## 3. Les comprimés se dissolvent dans la bouche ou dans un peu d'eau

Retirer le piston de la seringue

Mettre les comprimés dans la seringue puis le piston  
Prélever un peu d'eau et attendre que les comprimés aient fondu

Donner la morphine dans la bouche de votre enfant



4. Comme tous les médicaments, la morphine doit être tenue en lieu sûr et hors de portée des enfants. Rapporter à votre pharmacien les comprimés non utilisés.

## Surveillance pendant toute la durée du traitement

Votre enfant doit avoir un comportement habituel et moins mal

**! ATTENTION !**

*Si votre enfant est plus endormi*

*Si sa respiration est plus lente*

*S'il fait des pauses respiratoires*

**Appelez le 15**

Votre enfant est trop fatigué, plus endormi que d'habitude. Il est difficile à réveiller  
**appelez le 15**

Votre enfant doit respirer comme d'habitude. Si sa respiration vous semble plus lente compter le nombre d'inspiration (soulèvement du thorax) par minute

**Si la respiration est très lente moins de**

- 20 par minute chez le nourrisson de moins de 1 an
- 15 par minute chez l'enfant de 1 à 5 ans
- 12 par minute chez le grand de plus de 5 ans

**appelez le 15**

**En cas de doute, arrêter la morphine et contacter notre service d'urgences de l'hôpital Trousseau 24/24 au 01 44 73 68 75**